



БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

том 10 * № 5 * 1984

УДК 543.51+543.544:547.96

ПРЯМАЯ СТЫКОВКА МИКРОКОЛОНОЧНОГО ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА С МАСС-СПЕКТРОМЕТРОМ

Александров М.Л., Галль Л.Н., Краснов Н.В.,

Николаев В.Н., Павленко В.А., Шкуров В.А.,

Баран Г.И.*, Грачев М.А.*., Кнорре В.Д.*., Куснер Ю.С.*

Институт аналитического приборостроения Академии наук СССР, Ленинград;

* Новосибирский институт органической химии


Сибирского отделения Академии наук СССР

Прямая стыковка жидкостного хроматографа с масс-спектрометром (ЖХ-МС) представляет большой интерес для идентификации микрокомплексов трудноподдающихся и термически нестабильных соединений, в особенностях в органической и биоорганической химии. Однако стыковка ЖХ-МС в режиме реального времени требует создания качественно нового масс-спектрометра и сталкивается с проблемой выделения анализируемых веществ из большого объема раствора (элюата жидкостного хроматографа).

В настоящем сообщении описано осуществление прямой стыковки ЖХ-МС, основанной на использовании: а) микроколонической жидкостной хроматографии (хроматограф «Объ-4» или «Милихром») [1], протекающей в объеме, в десятки раз меньшем, чем в обычной высокоеффективной хроматографии, благодаря чему появляется возможность прямого введения элюата в масс-спектрометр; б) метода экстракции ионов из раствора в анализатор [2] масс-спектрометра (использован масс-спектрометр МХ-1320).

Выходящий из хроматографа элюат был направлен в устройство, регистрирующее ионы. Выделение ионов основано на распылении выходящего из капилляра раствора под действием неоднородного электрического поля на заряженные микрокапли (клusterы) и испарении нейтральных молекул клустеров при столкновении с молекулами воздуха при нормальных условиях. Образовавшиеся таким образом молекулярные ионы движутся в сверхзвуковой струе через сопло в форвакуумную секцию системы формирования пучка и затем через диафрагму в высоковакуумную область анализатора масс-спектрометра благодаря разности потенциалов между соплом и диафрагмой. Откачу газодинамической системы осуществляли последовательно насосами 2НВР-5Д (производительность 5 л/с) и НПМ-0,7 (700 л/с).

При испытании макета ЖХ-МС в реальном масштабе времени хроматографировали дансиларгинин на микроколонке (2×62 мм), упакованной сорбентом Нуклеосил 5 С-18 (Mashery-Nagel, ФРГ) в 30% изопропаноле с 0,01 М KH_2PO_4 (рН 3) (обращенно-фазовая хроматография) при скорости элюирования 5 мкл/мин. Элюат после кюветы спектрофотометра направляли непосредственно в описание выше устройство ввода. Масс-спектры, зарегистрированные до выхода пика дансиларгинина и во время выхода пика, приведены на рисунке. Важно отметить, что в полученных этим способом масс-спектрах анализируемое вещество выявляется только в виде протонированного молекулярного иона ($M\text{H}$)⁺ и молекулярно-ионного комплекса с катионом соли ($M\text{K}$)⁺.



Жидкостная хроматография – масс-спектрометрия дапсиларгинина. Фотометрическая регистрация хроматограммы при 210 нм, масс-спектры элюата в выбранных точках до появления пика (а) и во время выхода пика (б)

Сам факт практически количественного образования молекулярного иона из поступающего с элюатом вещества, отсутствие деструкции молекул и ионов, характерной для данного метода ионизации и выделения ионов из раствора, представляют интерес с точки зрения как простоты идентификации веществ, так и повышения чувствительности регистрации хроматограмм до теоретически возможного предела. Кроме того, отсутствие загрязнения данного устройства ввода ввиду недеструктивного воздействия на раствор упрощает его конструкцию и повышает работоспособность и надежность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров М. Л., Галль Л. И., Краснов И. В., Куснер Ю. С., Николаев В. Н., Павленко В. А., Шкуров В. А. Тез. докл. VI Всес. конференции по физике низкотемпературной плазмы. Л.: ЛИИЯФ АН СССР, 1983, т. 2, с. 460–464.
2. Bayram G. I., Grachev M. A., Komarova N. I., Petrelroyzen M. P., Bolvanov Ju. A., Kuzmin S. V., Kurgaltsev V. V., Kuper E. A. J. Chromatogr., 1983, v. 264, № 1, p. 69–83.